

# Karcinom prostate


## Faktori rizika za nastanak karcinoma prostate

Premda muškarci u svakoj životnoj dobi mogu dobiti karcinom prostate, obično oboljevaju stariji od 50 godina. Muškarci koji imaju porodičnu anamnezu karcinoma prostate (otac ili brat), imaju veći rizik za oboljevanje. Muškarci koji su gojazni i konzumiraju velike količine masnoća u ishrani imaju veći rizik za oboljevanje.

## Simptomi karcinoma prostate:

- Otežano mokrenje
- Smanjen mlaz urina
- Kapanje urina po završetku mokrenja
- Učestalo mokrenje, naročito noću
- Krv ili gnoj u urinu
- Bol tokom mokrenja
- Bol pri ejakulaciji
- Bol u kuku ili donjem dijelu leđa tokom dužeg perioda
- Bol u zdjelici
- Neželjen gubitak tjelesne težine ili gubitak apetita
- 

## Kako ljekar može pregledati prostatu



Ljekar porodične medicine može pregledati prostatu digitorektalnim pregledom. Pregled se izvodi na sledeći način: na kažiprst desne ruke se stavi rukavica koju ljekar namaže vazelinom. Potom, ljekar postavlja prst u čmar pacijenta i pažljivo pregleda prostatu. Diditorektalni pregled u cilju otkrivanja karcinoma prostate predstavlja dio Nacionalnog programa prevencije nezaraznih bolesti.

## Šta je PSA test

Drugi način pregleda prostate je test u krvi, koji se naziva PSA test. Muškarci sa karcinomom prostate mogu imati visok nivo PSA. Međutim, PSA može biti povišen i u drugim bolestima (infekcija).



## Kako se liječi karcinom prostate

Ukoliko se karcinom otkrije rano, prije nastanka metastaza, liječenje je uspješno. Lekar porodične medicine upućuje pacijenta urologu koji odlučuje o obliku liječenja (hemioterapija, zračenje)